Übungsaufgabe

Determinanten, Eigenwerte und Diagonalisierung

Universität: Technische Universität Berlin
Kurs/Modul: Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften
Erstellungsdatum: September 6, 2025

Zielorientierte Lerninhalte, kostenlos!
Entdecke zugeschnittene Materialien für deine Kurse:

<https://study.AllWeCanLearn.com>

Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

Aufgabe 1: Determinanten, Eigenwerte und Diagonalisierung

In dieser Aufgabe betrachten Sie typische Vorgehensweisen zur Bestimmung von Determinanten, Eigenwerten und der Diagonalisierung von Matrizen. Arbeiten Sie sauber mit Namen der Objekte (A , λ , Eigenvektoren) und formulieren Sie die Bedingungen, unter denen eine Diagonalisierung existiert.

a) Gegeben

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

i) Berechnen Sie $\det(A)$.

ii) Bestimmen Sie die Eigenwerte λ durch Lösen von $\det(A - \lambda I) = 0$.

iii) Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert einen Eigenvektor.

iv) Prüfen Sie, ob A diagonalisierbar ist. Falls ja, geben Sie eine Matrix P und eine Diagonalform D an, so dass $A = PDP^{-1}$.

b) Gegeben

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

i) Bestimmen Sie $\det(B)$.

ii) Bestimmen Sie die Eigenwerte von B durch das charakteristische Polynom $\det(B - \lambda I) = 0$.

iii) Bestimmen Sie zu jedem gefundenen Eigenwert einen Eigenvektor.

iv) Prüfen Sie, ob B diagonalisierbar ist. Falls ja, geben Sie eine Matrix P und eine Diagonalform D an, so dass $B = PDP^{-1}$.

c) Nicht diagonalisierbare Fallsituation (vertiefende Übung):

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

i) Bestimmen Sie die Eigenwerte von C und deren algebraische Multiplizität.

ii) Zeigen Sie, dass die geometrische Multiplizität von $\lambda = 2$ kleiner als die algebraische Multiplizität ist.

iii) Konkludieren Sie, dass C nicht diagonalisierbar ist. Geben Sie, sofern möglich, eine Jordanform J und eine Matrix P mit $C = PJP^{-1}$ an.

Aufgabe 2: Diagonalisierung und Eigenschaften von Matrizen

Untersuchen Sie weitere typische Fälle der Diagonalisierbarkeit und interpretieren Sie diese im Kontext linearer Abbildungen.

a) Sei

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

i) Bestimmen Sie $\det(A_1)$ und die Eigenwerte.

ii) Zeigen Sie, dass A_1 diagonalisierbar ist. Geben Sie eine Matrix P und eine Diagonalform D an, so dass $A_1 = PDP^{-1}$.

b) Sei

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

i) Bestimmen Sie $\det(A_2)$ und die Eigenwerte.

ii) Bestimmen Sie, ob A_2 diagonalisierbar ist. Erläutern Sie, welche Schlussfolgerung sich daraus ergibt, und geben Sie ggf. eine Form der Jordanzentrale an.

c) Sei

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

i) Bestimmen Sie die Eigenwerte von A_3 und deren algebraische Multiplizität.

ii) Beurteilen Sie die Diagonalisierbarkeit von A_3 über $\mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{C}$.

iii) Falls A_3 nicht diagonalisierbar ist, schildern Sie kurz den Aufbau einer möglichen Jordankette.

Lösungen

Aufgabe 1: Determinanten, Eigenwerte und Diagonalisierung

a)

Gegeben $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

i) $\det(A)$

$$\det(A) = 3 \cdot 2 - 0 \cdot 1 = 6.$$

ii) Eigenwerte λ durch $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\det \left(\begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} \right) = (3 - \lambda)(2 - \lambda) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 2.$$

iii) Zu jedem Eigenwert einen Eigenvektor Für $\lambda_1 = 3$: $A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Es gilt $y = 0$ und x beliebig, daher

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Für $\lambda_2 = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Gleichung $x + y = 0$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

iv) Diagonalisierbarkeit Da A zwei verschiedene Eigenwerte besitzt, ist A diagonalisierbar. Eine Diagonalisierung

$$A = PDP^{-1}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(3, 2),$$

mit $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ erfüllt $A = PDP^{-1}$.

b)

Gegeben

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

i) $\det(B)$

$$\det(B) = 4(3 \cdot 2 - 1 \cdot 0) - 1(0 \cdot 2 - 1 \cdot (-1)) + (-2)(0 \cdot 0 - 3 \cdot (-1)) = 24 - 1 + 6 = 17.$$

ii) Eigenwerte durch $\det(B - \lambda I) = 0$

$$B - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 & -2 \\ 0 & 3 - \lambda & 1 \\ -1 & 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Berechnung liefert das charakteristische Polynom

$$p(\lambda) = \det(B - \lambda I) = -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 24\lambda + 17 = -(\lambda^3 - 9\lambda^2 + 24\lambda - 17).$$

Die Nullstellen dieses Polynoms ergeben die Eigenwerte. Näherungsweise erhält man

$$\lambda_1 \approx 4.5315, \quad \lambda_2 \approx 3.3473, \quad \lambda_3 \approx 1.1212.$$

(Die Werte sind die reellen Nullstellen von $\lambda^3 - 9\lambda^2 + 24\lambda - 17 = 0$.)

iii) Zu jedem gefundenen Eigenwert einen Eigenvektor aus linearer Gleichung $(B - \lambda I)v = 0$ erhält man approximativ:

$$\lambda_1 \approx 4.5315 : \quad v_1 \approx \begin{pmatrix} -3.878 \\ 1.000 \\ 1.532 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_2 \approx 3.3473 : \quad v_2 \approx \begin{pmatrix} -0.467 \\ 1.000 \\ 0.347 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_3 \approx 1.1212 : \quad v_3 \approx \begin{pmatrix} -1.651 \\ 1.000 \\ -1.879 \end{pmatrix}.$$

iv) Diagonalisierbarkeit Da B drei verschiedene reelle Eigenwerte besitzt, ist B diagonalisierbar (über $\mathbb{R}$):

$$P = \begin{pmatrix} -3.878 & -0.467 & -1.651 \\ 1.000 & 1.000 & 1.000 \\ 1.532 & 0.347 & -1.879 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \approx \text{diag}(4.5315, 3.3473, 1.1212),$$

und $A = P D P^{-1}$.

c)

Nicht diagonalisierbare Fallsituation (vertiefende Übung):

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

i) Eigenwerte von C und deren algebraische Multiplizität

$$\det(C - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2 \Rightarrow \lambda = 2 \text{ mit algebraischer Multiplizität } 2.$$

ii) Geometrische Multiplizität von $\lambda = 2$

$$C - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \ker(C - 2I) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

also $\dim \ker(C - 2I) = 1$. Damit ist die geometrische Multiplizität kleiner als die algebraische Multiplizität.

iii) Folgerung C ist nicht diagonalisierbar. Die Jordankonstruktion liefert eine Jordanform $J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = C$ (ein einzelner Jordanblock der Größe 2). Eine Wahl von P mit $C = PJP^{-1}$ ist z. B. $P = I$ (dann $J = C$).

Aufgabe 2: Diagonalisierung und Eigenschaften von Matrizen

Untersuchen Sie weitere typische Fälle der Diagonalisierbarkeit und interpretieren Sie diese im Kontext linearer Abbildungen.

a) Sei

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

i) $\det(A_1)$ und die Eigenwerte

$$\det(A_1) = 2 \cdot 5 = 10, \quad \text{Eigenwerte } \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5.$$

ii) Diagonalisierbarkeit A_1 ist bereits diagonalisierbar (diagonal), z. B. $P = I$ und $D = A_1$, $A_1 = PDP^{-1}$.

b) Sei

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

i) $\det(A_2)$ und die Eigenwerte

$$\det(A_2) = 3 \cdot 3 - 0 \cdot 1 = 9, \quad \lambda = 3 \text{ (algebraische Multiplizität 2)}.$$

ii) Diagonalisierbarkeit und Jordankern Nicht diagonalisierbar, da die geometrische Multiplizität von $\lambda = 3$ gleich 1 ist. Die Jordanzentrale ist

$$J = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

und eine passende Permutationsmatrix P (z. B. $P = I$) erfüllt $A_2 = PJP^{-1}$.

c) Sei

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

i) Eigenwerte und algebraische Multiplizität Alle Diagonaleinträge sind 1, daher

$$\det(A_3 - \lambda I) = (1 - \lambda)^3 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ mit algebraischer Multiplizität 3.}$$

ii) Diagonalisierbarkeit über $\mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{C}$ Nicht diagonalisierbar, da $\dim \ker(A_3 - I) = 1$

(nur Eigenvektor multiples von $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$).

iii) Falls nicht diagonalisierbar, Aufbau einer Jordankette Eine mögliche Jordankette ist von Länge 3. Die Jordanform ist

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A_3.$$

Eine Wahl von P mit $A_3 = PJP^{-1}$ ist z. B. $P = I$.